

<b>ExkursionsNr</b> b110817	<b>BS Stöckheim, alter Friedhof</b>	am 17.08.2011
-----------------------------	-------------------------------------	---------------

<b>1</b> Arbeitstitel: 925 Stäubling mit Stacheln	Foto: 2395 - 2398	Bestimmung in %: <b>100</b>	<b>Exsikkat</b>
---	-------------------	-----------------------------	-----------------

<b>Lycoperdon foetidum</b>	<b>Stinkender Stäubling</b>
----------------------------	-----------------------------

Mit pyramidenförmig zusammengeneigten Stacheln, Stacheln dicker und kürzer als beim Igelstäubling. Beim alten Pilz glatte Exoperidie zwischen den Stacheln, alt braun mit 5-6cm Durchmesser, mit Stiel, Geruch unangenehm, leicht chemisch ?, auf Rasen, kein L. perlatum weil stachelig, kein L. umbrinum weil Stacheln hell, kein L. molle weil Stacheln zu hell und SPP ockerbraun (nicht rot-schokolade)

<b>2</b> Arbeitstitel: 118 Bleigrauer Bovist	Foto: 2410 - 2419	Bestimmung in %: <b>100</b>	<b>Exsikkat</b>
--	-------------------	-----------------------------	-----------------

<b>Bovista plumbea</b>	<b>Bleigrauer Bovist</b>
------------------------	--------------------------

Weiß, kugelig, glatt (ohne Stacheln, Warzen etc.), der Große ist ca. 3,5cm dick, kein Stiel, auf Rasen, Doppelte Peridie, die äußere ist brüchig, die innere sehr elastisch d.h. Bleigrauer Bovist!

<b>3</b> Arbeitstitel: 1796 Trichterling mit ockerbraunem Hut	Foto: 2422 - 2428	Bestimmung in %: <b>0</b>	<b>Exsikkat</b>
---	-------------------	---------------------------	-----------------

<b>Clitocybe spec</b>	<b>Trichterling</b>
-----------------------	---------------------

Älter erscheinender angetrockneter Pilz, Hut: braun, Rand gerieft und sehr dünnfleischig, Mitte dicker und leicht eingedellt, radialfaserig, 4cm, Lamellen: creme, vereinzelt untermischt, angewachsen mit kleinem Zahn herablaufend, Stiel: kräftig, weiß mit grauer Längsfaserung (+/- leicht schuppig), nach unten hin keulig, oben 10mm, unten 12-14mm, 4cm lang, innen gekammert, fühlt sich dadurch etwas wattig an, Stielbasis mit braunen Flecken, auf Rasen, Geruch unangenehm, alt deutlich spermatisch

<b>4</b> Arbeitstitel: 1556 Rotfußröhrling	Foto: 2431 - 2455	Bestimmung in %: <b>50</b>	<b>Exsikkat</b>
--	-------------------	----------------------------	-----------------

<b>Xerocomus chrysenteron</b>	<b>Rotfußröhrling</b>
-------------------------------	-----------------------

Sieht aus wie ein Rotfußröhrling, Röhren mit grauem Pilz befallen, Hut: trocken, eher feinsamig, 3,5cm, konvex, braun, Rand heller, keine Rottöne, auch nicht bei Verletzung der HH, Röhren: ca. 2-3mm lang (Hutfleisch 4-6mm dick), olivgelb, dicht stehend, Stiel: 8mm zur Basis hin dicker (12mm), Basis spitz zulaufend, obere Hälfte typisch rot längsfaserig, untere Hälfte braun längsfaserig, Stielspitze innen nicht orange, nicht blau anlaufend, auf Rasen neben Hecke, Geruch angenehm pilzig

<b>5</b> Arbeitstitel: 1516 Erdritterling	Foto: 2458 - 2479	Bestimmung in %: <b>50</b>	<b>Exsikkat</b>
---	-------------------	----------------------------	-----------------

<b>Tricholoma terreum</b>	<b>Mausgrauer Erdritterling</b>
---------------------------	---------------------------------

Erdritterlingsartig, keinerlei Gelbfärbung, Hut: jung konvex mit kegelförmiger Spitze (2cm), alt ausgebreitet mit Buckel/Kegel (5cm), wellig, radialfaserig, hell graubraun, metallisch, im Zentrum etwas dunkler und leicht punktiert, dünnfleischig (1-2mm) mit breiten Lamellen (5-7mm), Lamellen: weiß, ausgebuchtet, wellig, fast gesägt, untermischt, Stiel: 8mm \* 5-6cm, sehr brüchig, glatt, weiß, längsfaserig, auf Rasen, vereinzelte Birken, Geruch etwas chemisch, wie Leuchtgas, Geschmack: mehlig erdig, mild

<b>6</b> Arbeitstitel: 7 Champignon #1	Foto: 2482 - 2509	Bestimmung in %: <b>50</b>	<b>Exsikkat</b>
--	-------------------	----------------------------	-----------------

<b>Agaricus bitorquis</b>	<b>Stadtgerling</b>
---------------------------	---------------------

Champignon auf Rasen, keine Rot- oder Gelbtöne, Hut 5,5cm, bis 10mm dick, seidig weiß, sehr leichte Brauntönung, steht leicht über die Lamellen über, mit Erdresten bedeckt, Lamellen: frei, rosabraun bis dunkelbraun, Stiel: 10mm, zur Basis geringfügig dicker, oberhalb Ring braun längsfaserig gefärbt, unterhalb weiß bis leicht rot(braun) (alt), Ring flüchtig, Oberseite braun, Unterseite weiß, Geruch eher nicht nach Anis, aber ähnlich, auf Druck nicht gilbend, Stielbasis eher bräunend, ggf. rötlich

<b>7</b> Arbeitstitel: 1 Lamellenpilz #2	Foto: 2515 - 2536	Bestimmung in %: <b>0</b>	<b>Exsikkat</b>
--	-------------------	---------------------------	-----------------

---	<b>Unbestimmt</b>
-----	-------------------

Hut 2,5-3cm, dünn (max. 5mm), Rand eingerollt, seidig cremefarben, rosa Einschlag?, Zentrum geringfügig dunkler, Lamellen: breit angewachsen, am Stiel gegabelt, untermischt, creme, wellig, Schneiden heller wirkend, Stiel 5mm \* 2,5cm, gebogen, Stielspitze hell creme, nach unten hin dunkler werdend, kein Ring, Stielbasis spitz zulaufend, Geruch unbedeutend, nicht milchend, auf Rasen

<b>8</b> Arbeitstitel: 2485 Zwergtäubling	Foto: 2359 - 2554	Bestimmung in %: <b>100</b>	<b>Exsikkat</b>
---	-------------------	-----------------------------	-----------------

<b>Russula risigallina var. risigallina</b>	<b>Wechselfarbiger Dottertäubling</b>
---	---------------------------------------

Zwergtäubling, auf Rasen zwischen Birken, Hut: hellocker-gelb-braun, 2,5cm, ca. 5mm dick, eingedellt, HH komplett abziehbar, Hutrand leicht gerieft, Lamellen: weiß mit cremeton (von SP), keine Lamellen, brüchig, dicht stehend, angewachsen, Stiel: Spitze dicker und heller, zur Basis hin dünner werdend, eher wattig, leichte Braunfleckigkeit, Geruch obstig, Geschmack mild, Chemie: KOH: neutral, Guajak nach 5-10s: blaugrün, FeSo4: nach 1 Minute zart rosa, Phenol 2%: Nach Minuten dunkel kirschrot, Nach Makroskopischem Schlüssel von Frieder Gröger (1980): R. chamaeleontina (Fr. ss. Romagn) das ist nach Pilze der Schweiz R. risigallina var. risigallina

<b>9</b> Arbeitstitel: 7 Champignon #3	Foto: 2557 - 2572	Bestimmung in %: <b>50</b>	<b>Exsikkat</b>
--	-------------------	----------------------------	-----------------

<b>Agaricus bitorquis</b>	<b>Stadtgerling</b>
---------------------------	---------------------

Wie Champignon #1, jedoch mit etwas stärkeren Rottönen an der Stielbasis (wenn auch immer noch schwach), Hut 4,5-5cm, Hutdicke ca. 1cm, Ring oben braun, unten weiß, keine Gelbfärbung, Geruch ganz entfernt nach Anis? Auf Rasen bei Birken

<b>10</b> Arbeitstitel: 23 Ackerling	Foto: 2575 - 2584	Bestimmung in %: <b>100</b>	<b>Exsikkat</b>
--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------

<b>Agrocybe semiorbicularis</b>	<b>Halbkugeliger Ackerling</b>
---------------------------------	--------------------------------

Kleiner zäher ockerbrauner Pilz mit langem elastischen Stiel, Hut: bis 15mm, ockerbraun, konvex, trocken faltig, ca. 0,5-1mm dick, nicht gerieft, Lamellen: scholadenbraun, angewachsen mit Zähnchen, 2-3mm dick, Schneiden wirken heller als Lamellenfläche, Stiel: 2-3mm dünn, 4-6cm lang, ohne Ring, längsgefaserig, sehr elastisch, verbogen, Stielbasis verdickt und weißlich, auf Rasen zwischen Birken

<b>11</b> Arbeitstitel: 887 Schirmling	Foto: 2588 - 2609	Bestimmung in %: <b>100</b>	<b>Exsikkat</b>
--	-------------------	-----------------------------	-----------------

<b>Lepiota cristata</b>	<b>Stinkschirmling</b>
-------------------------	------------------------

Kleiner weißer Schirmling mit braunem aufgerissenen Hutzentrum, Hut: konvex-glockig-kegelig, weiß mit fuchsbraunem aufgerissenen Velum, Velum zum Rand hin weniger werdend, Hutrand eingebogen mit Velumresten, Hutfleisch: Am Rand dünn, in der Mitte dick (5mm) Lamellen: hell creme, frei, untermischt, Stiel: hohl, mit flüchtigem aufsteigendem Ring, oberhalb vom Ring weiß, unterhalb vom Ring mit bräunlichem Einschlag, glatt, marmoriert erscheinend, 3-4mm dick, zur Stielbasis hin 5mm, Verletzungen ins rotbraune, Geruch chemisch, Leuchtgas, auf Rasen zwischen Birken