

# Fundliste Oberhof Nord Krippenkopf

am 29.08.2011

Internetversion

Erstellt von Klaus Bornstedt am

Donnerstag, 8. September 2011

MTB5230/1

Umgebung **Montaner feuchter saurer Fichtenwald**

650 m ü.N

Wetter **Kühler Tag (14Grad) nach kühlem trockenen und kühlen nassen Tag, davor eine Woche sehr warm mit gelegentlichen Niederschlägen**

ExkursionsNr **b110829 Oberhof Nord Krippenkopf**

am 29.08.2011

<b>1</b>	Arbeitstitel: 1372 Stachelbeertäubling	Foto: 5578 - 5601	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Russula queletii</b>		<b>Stachelbeertäubling, Säufernase</b>	
Kleiner Täubling, bis 6cm, Hut: purpurrot bis ockerbraun, Zentrum dunkler, Stiel: leicht purpurrot angehaucht, Geruch: neutral, Geschmack: sehr scharf			
<b>2</b>	Arbeitstitel: 1798 Cortinarius #1	Foto: 5603 - 5605	Bestimmung in %: <b>0</b>
<b>Cortinarius spec</b>		<b>Cortinariusart</b>	
<b>3</b>	Arbeitstitel: 46 Porphyrwulstling	Foto: 5607 - 5617	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Amanita porphyria</b>		<b>Porphyrbrauner Wulstling</b>	
Der kleinere Porphyrwulstling: Hutdurchmesser: 4,5cm, Stiel: Spitze: 5-6mm, Basis: 7-8mm, Länge 6-7cm			
<b>4</b>	Arbeitstitel: 96 Schönfußröhrling	Foto: 5622 - 5628	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Boletus calopus</b>		<b>Schönfußröhrling</b>	
<b>5</b>	Arbeitstitel: 273 Cortinarius anomalis	Foto: 5631 - 5653	Bestimmung in %: <b>80</b>
<b>Cortinarius anomalus</b>		<b>Braunvioletter Dickfuß</b>	
<b>6</b>	Arbeitstitel: 38 Fuchsigbrauner Scheidenstreifling	Foto: 5656 - 5661	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Amanita fulva</b>		<b>Rotbrauner Scheidenstreifling, Fuchsigbrauner Scheidenstreifling</b>	
<b>7</b>	Arbeitstitel: 2488 Graublauer Dickfuss	Foto: 5665 - 5671	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Cortinarius pseudocyanites</b>		<b>Graublauer Dickfuß</b>	
Hat einen gelben Gürtel oben am Stiel			
<b>8</b>	Arbeitstitel: 931 Lycoperdon umbrinum	Foto: 5674 - 5680	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Lycoperdon umbrinum</b>		<b>Brauner Stäubling</b>	
Nach Bil- und Textvergleich in BK und RH ist es der Lycoperdon umbrinum. Stacheln für Igelstäubling zu kurz			
<b>9</b>	Arbeitstitel: 753 Wolliger Risspilz	Foto: 5688 - 5700	Bestimmung in %: <b>80</b>
<b>Inocybe lanuginosa</b>		<b>Wolliger Reißpilz</b>	
Hut: stark fransig schuppig, Lamellen: angewachsen bis herablaufend, Schneide etwas heller, Stiel: beflockt, Flecken in der Mitte dunkler			
<b>10</b>	Arbeitstitel: 149 Trompetenpfefferling	Foto: 5707 - 5728	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Cantharellus tubaeformis</b>		<b>Trompetenpfefferling</b>	
Noch sehr junge Trompetenpfefferlinge			
<b>11</b>	Arbeitstitel: 2489 Blaue Nuß	Foto: 5730 - 5739	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Chamonixia caespitosa</b>		<b>Blaunuß</b>	
Wir wohl bald Leccinum caespitosum heißen, gehört zur Familie der Röhrlinge, oben ist der Stielansatz zu sehen			
<b>12</b>	Arbeitstitel: 385 Safranfleischiger Dickfuß	Foto: 5740 - 5752	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Cortinarius traganus</b>		<b>Lila Dickfuß, Safranfleischiger Dickfuß</b>	
Im Anschnitt safranfarben und nicht lila, wie der Bocksdickfuß (C. campheratus), der außerdem stinkt. Beide sind äußerlich kaum unterscheidbar. Und beide sind Doppelgänger vom Reispilz (Zigeuner)			
<b>13</b>	Arbeitstitel: 1191 Ohrförmiger Weißseitling	Foto: 5733 - 5791	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Phyllotus porrigens</b>		<b>Ohrförmiger Seitling, Ohrförmiger Weißseitling</b>	
Die größeren Exemplare haben ca. 5cm Hutdurchmesser, in China als Gehirnschädigend eingestuft bei Personen mit Nierenerschaden			
<b>14</b>	Arbeitstitel: 106 Wurzelnder Bitterling	Foto: 5794 - 5804	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Boletus radicans</b>		<b>Wurzelnder Bitterröhrling</b>	
Sehr mächtiger Pilz, Hutdurchmesser ca. 8cm, Stiellänge ca. 10cm, Färbt sich im Anschnitt sofort blau, verliert sich nach 30 Minuten, Fleisch mit Melzer orange, beim Schönfußröhrling wird es blau, Stiel: ohne oder fast ohne Netz, Geschmack: bitter			
<b>15</b>	Arbeitstitel: 845 Flattermilchling	Foto: 5810 - 5811	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Lactarius theiogalus</b>		<b>Flatter-Milchling</b>	
Kleiner Milchling (bis 4cm Hutdurchmesser), Hut: Alt mit Buckel, drum herum runzlig, Milch wird auf Taschentuch gelblich. Im sauren Fichtenwald mit Birken, Mykorrhizza-Partner zu Fichte und Birke			
<b>16</b>	Arbeitstitel: 1367 Apfeltäubling	Foto: 5826 - 5832	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Russula paludosa</b>		<b>Apfeltäubling</b>	
Leuchtendes Rot, Hutzentrum eher goldgelb, Hutmitte glänzt, Lamellen: cremefarben			
<b>17</b>	Arbeitstitel: 364 Spitzgebuckelter Raukopf	Foto: 5836 - 5838	Bestimmung in %: <b>100</b>
<b>Cortinarius rubellus</b>		<b>Spitzgebuckelter Raukopf</b>	
Kollektion mit ungewöhnlichen Formen			

**18** Arbeitstitel: 2491 Mooschwefelkopf

Foto: 5863 - 5881

Bestimmung in %: **80****Hypholoma elongatum****Torfmooschwefelkopf**

Mooschwefelkopf, eine von 4 Arten, die sich durch Sporengrößen unterscheiden

**19** Arbeitstitel: 666 Duftender Schneckling

Foto: 5883 - 5889

Bestimmung in %: **100****Hygrophorus agathosmus****Wohlriechender Schneckling, Duftender Schneckling**

Riecht nach Bittermandel